


## RASSENKEUZE



## SUIKERBIETEN

Veredelaars bedienen bietentelers op hun wensen

Wie bietenquotum elk jaar vol-  
lert, laat geld liggen

Bietenzaad ondergaat veel bewerkingen

Suikerbietenenteelt is een stabiele, redelijk voorspelbare teelt op het akkerbouwbedrijf. Bieten komen altijd wel uit de grond en vrijwel altijd groeien ze goed. Een belangrijk moment in de suikerbietenenteelt is de rassenkeuze, die plaats moet vinden in de maanden december en januari. De nieuwe Rassenlijst laat zien dat kweekwerk voor nieuwe situaties steeds nieuwe en be-

# Veel keus in Rassenlijst 2002

## Voor iedere boer op haast iedere grond bes

Er staan 11 nieuwe rassen op de Aanbevelende Rassenlijst 2002. Voor de verschillende teelt-situaties is er voor het komende jaar voldoende keus. Tegelijk met de behoefte aan rhizomanie-resistente rassen neemt ook het aanbod toe. Maar liefst zeven zijn er bijgekomen. Bijna elke teler kan een voor hem geschikt ras kiezen.

DE SITUATIE op een perceel is bepalend voor de keuze van het ras. De kans op het optreden van ziekten is een belangrijk criterium. De laatste jaren heeft rhizomanie zich uitgebreid. De behoefte aan rassen met

Zonder specifieke resistenties

### 1. DE RASSEN BLENHEIM, HUMBER EN METEOR ZIJN NIEUW IN DE RASSENLIJST 2002

Eigenschappen van suikerbietenrassen, bepaald onder niet-besmette omstandigheden

Rassenlijst rubriek	rasnaam	waarde- ringscijfer		verhoudingsgetallen (gem. 1998 - 2001)*							
		vroegeheid grondbedekking	kophoogte	grondtarra	gehalte aan K + Na	$\alpha$ -amino N	suikergehalte	WIN	wortelopbrengst	suikeropbrengst	financiële opbrengst**
<i>rassen zonder specifieke resistenties</i>											
A	Bronco	5,5	106	88	99	107	99	100	103	101	101
A	Helsinki	7,5	105	104	103	108	100	100	101	101	101
A	Santana	8,5	101	107	100	97	98	100	104	102	101
A	Assist	7,5	102	99	101	102	98	100	103	101	100
A	H 66372 (Colorado)	7,5	95	104	99	96	102	100	96	98	100
B	Majestic	7,5	97	101	102	101	99	100	101	100	99
B	Winsor	8	95	97	95	89	104	101	92	96	98
N	Blenheim	8	105	96	102	102	99	100	105	104	103
N	Humber	8	101	100	101	97	99	100	102	101	101
N	Meteor	8	97	103	105	96	98	100	104	102	101
<i>ras met resistentie tegen cercospora (bepaald onder niet-besmette omstandigheden in 2000 en 2001)</i>											
B	Sirio	8	100	101	104	96	99	100	96	95	94

\* 100 = gemiddelde A en N-rassen van Rassenlijst 2001

\*\* Uitgangspunten voor berekening financiële opbrengst: wortelopbrengst 59 ton/ha; suikergehalte 16,0 %;  $\alpha$ -amino N: 18 mmol/kg; K + Na: 50 mmol/kg; grondtarra: 8 %

Van de rassen zonder resistenties scoort Blenheim van Advanta het op gezonde grond op bijna alle punten het best.