

Verwijder bronnen van vergelingsziekte

Bieten of resten van bieten, die vorig jaar geïnfecteerd waren met een van de vergelingsvirussen, vormen een belangrijke besmettingsbron voor de bieten van dit jaar als er blad op komt. Op percelen waar (nog) niet is geploegd, maar ook op kopakkers kunnen na een warme winter uitgelopen bietenkoppen zichtbaar zijn. Dit zijn, net als de uitgelopen bieten in bietenhopen, belangrijke bronnen van de vergelingsvirussen. Het advies is om bij het uitvoeren van een onkruidbestrijding in het voorjaar in de gewassen die nu op deze percelen te staan, indien mogelijk, voor een middel te kiezen dat suikerbietenopslag bestrijdt.

Om verspreiding van vergelingsziekte tegen te gaan, heeft de NVWA een teeltvoorschrift, waarin staat dat bieten met bladvorming niet voorhanden of in voorraad mogen zijn en dus tijdig vernietigd moeten worden. Dit geldt ook voor voederbieten.

Meer informatie over het teeltvoorschrift kunt u lezen op de website van de NVWA, te bereiken via www.irs.nl/teeltvoorschrift.

Elma Raaijmakers



Opslag van suikerbieten in tarwe kan een bron zijn van vergelingsvirus