

HERHALEN EN AFRONDEN BLADSCHIMMELBESTRIJDING

De bladschimmelbestrijding is dit jaar al vroeg in de zomer gestart. Wanneer er bij de eerste aantasting gespoten is, is de basis gelegd voor het beste resultaat. Het loof gezond houden tot aan de oogst is een voorwaarde om de suikerbieten optimaal te laten doorgroeien in het najaar.



Herhaling van de fungicidenbespuiting is alleen nodig bij nieuwe aantasting door bladschimmels. Let bij de laatste bespuiting op de veiligheidstermijn in combinatie met de geplande oogstdatum.

De bladschimmels stemphylium, cercospora, ramularia, roest en meeldauw kunnen zorgen voor het vroegtijdig afsterven van het suikerbietenloof. De bestrijding van deze schimmels in suikerbieten past binnen een geïntegreerde gewasbescherming.

Blijven waarnemen

Om de fungicidenbespuitingen effectief in te zetten, is het verstandig om 2-3 weken na de fungicidenbespuiting weer op stemphylium, cercospora, ramularia, roest en meeldauw te controleren. Het kan voorkomen dat u een aantal maal geen nieuwe aantasting vindt. U hoeft dan niets anders te doen dan een week later weer het gewas te inspecteren.

De aantasting en ontwikkeling van bladschimmels is geheel afhankelijk van de weersomstandigheden, de schimmeldruk en het microklimaat in het gewas.



Voor optimale groei is gezond blad tot aan de oogst een belangrijke voorwaarde.

Wanneer de omstandigheden voor de schimmel ongunstig zijn, zal hij zich niet of nauwelijks ontwikkelen. In dat geval is het niet nodig elke 3-4 weken de fungicidenbespuiting te herhalen.

Spuut bij nieuwe aantasting

Het is alleen rendabel om een bladschimmelbestrijding uit te voeren wanneer één of meer bladschimmels zich uitbreiden op de jongst volgroeide bladeren. Spuit alleen

als de bieten nog minimaal 4 weken in het veld blijven staan. Na oktober is het vrijwel nooit nodig om een bladschimmelbestrijding uit te voeren.

Veiligheidstermijn

Als een behandeling zinvol is, houd dan wel rekening met de veiligheidstermijnen van de middelen. De veiligheidstermijn is de minimale periode die tussen de laatste fungicidenbespuiting en de oogst van de suikerbieten moet zitten. Die is voor Allegro, Retengo Plust, Score 250 EC en Spyrale vier, voor Sphere drie en voor Opus Team twee weken.

Middelenkeuze belangrijk

Houd bij een eventuele bespuiting rekening met de etiketten van de middelen, het gebruikadvies en welk middel u al hebt gebruikt bij eerdere bespuitingen. Wissel middelen ook binnen het seizoen zoveel mogelijk af om resistentievorming te voorkomen. Kies het middel aan de hand van de gevonden aantasting. Meer informatie hierover kunt u lezen op www.irs.nl/bladschimmel.

Bram Hanse

Rubriek onder
verantwoordelijkheid van:



Postbus 32, 4600 AA Bergen op Zoom

Tel.: +31 (0) 164 274 400
Fax.: +31 (0) 164 250 962

irs@irs.nl
www.irs.nl

Eindredactie: Jurgen Maassen