



# Gevolgen nieuwe WG's voor herbiciden

Peter Wilting

SID 10/11 december 2013

**Voor 1-1-2013: Wettelijk gebruiksvoorschrift (WG) en Gebruiksaanwijzing (GA)**

**Vanaf 1-1-2013: WG en GA omgevormd naar één nieuw WG.**

**Doel\*:**

- eenduidiger
- gebruikersvriendelijker
- beter handhaafbaar

\*Bron: Min. van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie



## Nieuw WG

Ieder middel vermelding van:

- dosering per toepassing
- maximaal aantal toepassingen
- maximale dosering per hectare
- minimale interval tussen bespuitingen

**Overeenkomstig toelatingsaanvraag!**



## Etikettekst-Safari

### WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel door middel van een na opkomst toepassing in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsgebied	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Maximaal aantal kg middel per ha per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Bieten	breedbladige onkruiden	30 g/ha*	4	0,12	7

\* in LDS systeem in combinatie met toegelaten middelen

Het gebruik in de teelt van witlof en cichorei is beoordeeld conform de "vereenvoudigde uitbreidingsproductieluwe". Er is voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en fyto-toxiciteitsonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in dit/deze toepassingsgebied(en), komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Maximaal aantal kg middel per ha per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Witlof (pennenteelt en zaadteelt)	breedbladige onkruiden	10-30 g/ha*	4	0,06	14
Cichorei	breedbladige onkruiden	10-30 g/ha*	4	0,06	14

\* in LDS-systeem in combinatie met toegelaten middelen



## Voorbeeld 1: fenmedifam in LDS

middel	dosering/ toepassing (l/ha)	max. aantal toep.	max. totale dosering (l/ha)	minimum interval (dagen)
<b>Agrichem Fenmedifam</b>	0,5 - 1,0	4	6	7
<b>Corzal</b>	0,5 - 1,0	4	6	7
<b>Kontakt 320 SC</b>	0,25 - 0,5	6	6	7



## Voorbeeld 2: middelen tegen grasachtige onkruiden

middel	dosering/ toepassing (l/ha)	max. aantal toep.
<b>Focus Plus</b>	1,0 - 6,0	1
<b>Fusilade Max</b>	1,0 - 3,0	1
<b>Pilot</b>	1,0 - 3,0	1
<b>Aramo/Gras-Weg</b>	1,0 - 1,5	1



## Situatie 2014

- **opgebruiktermijn tot 1 juli 2015: middel met oude etiket als voorheen**
- **middel met nieuw etiket: toepassen volgens WG. Onduidelijkheid over lagere dosering per toepassing**
- **toepassingslimiet bereikt: overschakelen naar ander middel met zelfde werkzame stof mogelijk!**
- **aan nieuwe WG's insecticiden en fungiciden wordt gewerkt**



## Situatie na opgebruiktermijn

- **vanaf 1 juli 2015 gelden alle 'nieuwe' WG's**
- **aanpassing WG: uitbreidingsaanvraag door toelatinghouder**



## **Uitbreiding toelating Centium 360 CS**

### **Toelating na opkomst in LDS:**

- **0,05-0,1 l/ha, vanaf 4-bladstadium bieten**
- **maximaal 4 toepassingen**
- **maximaal 0,2 l/ha middel**
- **minimale interval: 7 dagen**



## **Centium 360 CS**

- **vooral effectief tegen bingelkruid, hondspeterselie, varkensgras, meldesoorten, kleefkruid**
- **witgeelverkleuring mogelijk**
- **niet toepassen in combinatie met chloridazon (bijv. Pyramin), Avadex**
- **voorkom overdoseringen (bijv. overlappingsen in geren)**



## Witgeelverkleuring door Centium 360 CS na opkomst

